

# Traitements administrables par voie Sous-Cutanée (SC)

Clinique de Soins Palliatifs du CHU Grenoble Alpes - mars 2020

	AMM	POSSIBLE MAIS PAS DE NIVEAU DE PREUVE DE L'EFFICACITE	PREPARATION
<b>ANTIBIOTIQUES</b>			
	THIOPHENICOL		
		CEFTRIAXONE	1 g dans 5 ml de xylocaïne 1% en SC
		TEICOPLANINE <sup>B</sup>	En SC directe ou perfusion SC sur 30 minutes
		AMIKACINE	En SC directe ou perfusion sur 15 à 30 minutes
		CEFEPIME	Perfusion en SC sur 30 minutes
		TOBRAMYCINE	Perfusion en SC sur 20 minutes après dilution dans 50 ml de NaCl 0.9%
		AUGMENTIN	
		AMPICILLINE <sup>C</sup>	Discontinue
		GENTAMYCINE <sup>C</sup>	Discontinue
<b>OPIOIDES</b>			
	MORPHINE		
	OXYCODONE		
	BUPRENORPHINE		
	NALBUPHINE		
		TRAMADOL <sup>C</sup>	
		FENTANYL <sup>C</sup>	
		SUFENTANIL <sup>C</sup>	
		METHADONE	Forme injectable en ATU
<b>ANTIDOTE OPIOIDE</b>			
	NALOXONE		Discontinue ou Continue
<b>AUTRES ANTALGIQUES</b>			
		KETAMINE <sup>C</sup>	Continue
		PARACETAMOL	
		NEFOPAM <sup>C</sup>	
<b>CORTICOIDES</b>			
		DEXAMETHASONE	En SC directe
		METHYLPREDNISOLONE	SC directe ou perfusion sur 15 minutes
<b>AINS</b>			
		KETOPROFENE	
<b>ANTI-ULCEREUX</b>			
		ESOMEPRAZOLE	Dilution dans 50 ml de NaCl de 0.9% pendant 1 heure
		OMEPRAZOLE <sup>C</sup>	Dilution dans 100 ml de NaCl 0.9% ou injection directe stricte
		RANITIDINE	Continue
<b>BIPHOSPHONATES</b>			
		ZOLEDRONATE ZOMETA®	
<b>ANTISPASMODIQUES</b>			
	SCOPOLAMINE®		
	SCOBUREN®		
	OCTREOTIDE		Mettre à température ambiante avant d'injecter

<b>ANTISPASMODIQUES (suite)</b>			
	LANREOTIDE LP (Somatuline® LP)		Pas la forme LP 30 mg
	ATROPINE		
		PHLOROGLUCINOL	
<b>ANTIEMETIQUES</b>			
		METOCLOPRAMIDE <sup>C</sup>	Discontinue ou Continue
		CHLORPROMAZINE <sup>C</sup>	Eviter Continue
		HALOPERIDOL <sup>C</sup>	Discontinue ou Continue
		GRANISETRON	Injection directe stricte
		ONDANSETRON <sup>C</sup>	Continue
<b>DIURETIQUES</b>			
		FUROSEMIDE <sup>C</sup>	Discontinue
<b>ANTIHYPERTENSEUR</b>			
		CLONIDINE	
<b>ANTIHISTAMINIQUES</b>			
	DEXCLHORPHENIRAMINE		Discontinue
		HYDROXYZINE	Pas de preuves Discontinue
<b>ANXIOLYTIQUES</b>			
		MIDAZOLAM <sup>B</sup>	Discontinue ou Continue
		CLONAZEPAM	Discontinue Injection directe stricte
		CLORAZEPATE	Discontinue
		DIAZEPAM	Discontinue
<b>ANTIDOTE BENZODIAZEPINES</b>			
		FLUMAZENIL	Discontinue
<b>NEUROLEPTIQUES</b>			
(pour Metoclopramide, Haloperidol, Chlorpromazine voir à anti-émétiques)			
		LEVOMEPRAMAZINE <sup>C</sup>	Discontinue ou Continue
		CYAMEMAZINE	Discontinue
		TIAPRIDE	Discontinue Injection directe stricte
<b>ANTIDEPRESSEURS</b>			
		AMITRIPTYLINE	Discontinue ou Continue
		CLOMIPRAMINE	
		CITALOPRAM	
<b>STIMULANT DU TRANSIT</b>			
	PROSTIGMINE		
	BROMURE DE METHYLNATREXONE		

Grade<sup>B</sup> : présomption scientifique

Grade<sup>C</sup> : faible niveau de preuve

Discontinue = Pas dans une perfusion en continue

ATU : Autorisation Temporaire d'Utilisation

Références :

1. ROCEPHINE et génériques : ne pas administrer par voie sous-cutanée, sauf cas très exceptionnels (EDIT du 14 novembre 2019) [Internet]. VIDAL. [cité 1 avr 2020]. Disponible sur: [https://www.vidal.fr/actualites/23918/rocephine\\_et\\_generiques\\_ne\\_pas\\_administrer\\_par\\_voie\\_sous\\_cutanee\\_sauf\\_cas\\_tres\\_exceptionnels\\_edit\\_du\\_14\\_novembre\\_2019/](https://www.vidal.fr/actualites/23918/rocephine_et_generiques_ne_pas_administrer_par_voie_sous_cutanee_sauf_cas_tres_exceptionnels_edit_du_14_novembre_2019/)
2. Nijland L, Schmidt P, Frosch M, Wager J, Hübner-Möhler B, Drake R, et al. Subcutaneous or intravenous opioid administration by patient-controlled analgesia in cancer pain: a systematic literature review. Support Care Cancer. 1 janv 2019;27(1):33-42.
3. Thérapeutiques médicamenteuses administrables par voie sous cutanée en soins palliatifs : revue de littérature [Internet]. [cité 1 avr 2020]. Disponible sur: [http://www.sfap.org/system/files/dr\\_vassal.pdf](http://www.sfap.org/system/files/dr_vassal.pdf)