

Traitements administrables par voie Sous-Cutanée (SC)

Clinique de Soins Palliatifs du CHU Grenoble Alpes - mars 2020

	AMM	POSSIBLE MAIS PAS DE NIVEAU DE PREUVE DE L'EFFICACITE	PREPARATION
ANTIBIOTIQUES			
	THIOPHENICOL		
		CEFTRIAXONE	1 g dans 5 ml de xylocaïne 1% en SC
		TEICoplanine ^B	En SC directe ou perfusion SC sur 30 minutes
		AMIKACINE	En SC directe ou perfusion sur 15 à 30 minutes
		CEFEPIME	Perfusion en SC sur 30 minutes
		TOBRAMYCINE	Perfusion en SC sur 20 minutes après dilution dans 50 ml de NaCl 0.9%
		AUGMENTIN	
		AMPICILLINE ^C	Discontinue
		GENTAMYCINE ^C	Discontinue
OPIOIDES			
	MORPHINE		
	OXYCODONE		
	BUPRENORPHINE		
	NALBUPHINE		
		TRAMADOL ^C	
		FENTANYL ^C	
		SUFENTANIL ^C	
		METHADONE	Forme injectable en ATU
ANTIDOTE OPIOIDE			
	NALOXONE		Discontinue ou Continue
AUTRES ANTALGIQUES			
		KETAMINE ^C	Continue
		PARACETAMOL	
		NEFOPAM ^C	
CORTICOIDES			
		DEXAMETHASONE	En SC directe
		METHYLPREDNISOLONE	SC directe ou perfusion sur 15 minutes
AINS			
		KETOPROFENE	
ANTI-ULCEREUX			
		ESOMEPRAZOLE	Dilution dans 50 ml de NaCl de 0.9% pendant 1 heure
		OMEPRAZOLE ^C	Dilution dans 100 ml de NaCl 0.9% ou injection directe stricte
		RANITIDINE	Continue
BIPHOSPHONATES			
		ZOLEDRONATE ZOMETA®	
ANTISPASMODIQUES			
	SCOPOLAMINE®		
	SCOBUREN®		
	OCTREOTIDE		Mettre à température ambiante avant d'injecter

ANTISPASMODIQUES (suite)			
	LANREOTIDE LP (Somatuline® LP)		Pas la forme LP 30 mg
	ATROPINE		
		PHLOROGLUCINOL	
ANTIEMETIQUES			
		METOCLOPRAMIDE ^C	Discontinue ou Continue
		CHLORPROMAZINE ^C	Eviter Continue
		HALOPERIDOL ^C	Discontinue ou Continue
		GRANISETRON	Injection directe stricte
		ONDANSETRON ^C	Continue
DIURETIQUES			
		FUROSEMIDE ^C	Discontinue
ANTIHYPERTENSEUR			
		CLONIDINE	
ANTIHISTAMINIQUES			
	DEXCLHORPHENIRAMINE		Discontinue
		HYDROXYZINE	Pas de preuves Discontinue
ANXIOLYTIQUES			
		MIDAZOLAM ^B	Discontinue ou Continue
		CLONAZEPAM	Discontinue Injection directe stricte
		CLORAZEPATE	Discontinue
		DIAZEPAM	Discontinue
ANTIDOTE BENZODIAZEPINES			
		FLUMAZENIL	Discontinue
NEUROLEPTIQUES			
(pour Metoclopramide, Haloperidol, Chlorpromazine voir à anti-émétiques)			
		LEVOMEPRAMAZINE ^C	Discontinue ou Continue
		CYAMEMAZINE	Discontinue
		TIAPRIDE	Discontinue Injection directe stricte
ANTIDEPRESSEURS			
		AMITRIPTYLINE	Discontinue ou Continue
		CLOMIPRAMINE	
		CITALOPRAM	
STIMULANT DU TRANSIT			
	PROSTIGMINE		
	BROMURE DE METHYLNATREXONE		

Grade^B : présomption scientifique

Grade^C : faible niveau de preuve

Discontinue = Pas dans une perfusion en continue

ATU : Autorisation Temporaire d'Utilisation

Références :

1. ROCEPHINE et génériques : ne pas administrer par voie sous-cutanée, sauf cas très exceptionnels (EDIT du 14 novembre 2019) [Internet]. VIDAL. [cité 1 avr 2020]. Disponible sur: https://www.vidal.fr/actualites/23918/rocephine_et_generiques_ne_pas_administrer_par_voie_sous_cutanee_sauf_cas_tres_exceptionnels_edit_du_14_novembre_2019/
2. Nijland L, Schmidt P, Frosch M, Wager J, Hübner-Möhler B, Drake R, et al. Subcutaneous or intravenous opioid administration by patient-controlled analgesia in cancer pain: a systematic literature review. Support Care Cancer. 1 janv 2019;27(1):33-42.
3. Thérapeutiques médicamenteuses administrables par voie sous cutanée en soins palliatifs : revue de littérature [Internet]. [cité 1 avr 2020]. Disponible sur: http://www.sfap.org/system/files/dr_vassal.pdf